


ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ ЖИВОТА, ПРОНИКАЮЩЕМ РАНЕНИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА.

1. Первая помощь при ранении живота.



Нельзя вправлять выпавшие органы в брюшную полость. Запрещено пить и есть! Для утоления чувства жажды смачивай губы.



Вокруг выпавших органов положи валик из марлевых бинтов (защити выпавшие внутренние органы).



Поверх валиков наложи асептическую повязку. Не прижимая выпавшие органы, прибинтуй повязку к животу.



Наложите холод на повязку.




Защити пострадавшего от переохлаждения. Укутай теплыми одеялами, одеждой.

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) **"скорую помощь"**, обеспечь доставку пострадавшего в лечебное учреждение.

2. Первая помощь при проникающем ранении грудной клетки


Признаки: кровотечение из раны на грудной клетке с образованием пузырей, подсасывание воздуха через рану.



При отсутствии в ране инородного предмета прижми ладонь к ране и закрой в нее доступ воздуха. Если рана **сквозная**, закрой **входное и выходное** раневые отверстия.



Закрой рану воздухонепроницаемым материалом (**герметизируй рану**), зафиксируй этот материал повязкой или пластырем.



Придай пострадавшему положение "полусидя". Приложи холод к ране, подложив тканевую прокладку.




При наличии в ране инородного предмета зафиксируй его валиками из бинта, пластырем или повязкой. Извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия запрещается!

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) **"скорую помощь"**, обеспечь доставку пострадавшего в лечебное учреждение.

3. Первая помощь при кровотечении из носа

Причины: травма носа (удар, царапина); заболевания (высокое артериальное давление, пониженная свертываемость крови); физическое перенапряжение; перегревание.




Усади пострадавшего, слегка наклони его голову вперед и дай стечь крови. Сожми на 5-10 минут нос чуть выше ноздрей. При этом пострадавший должен дышать ртом!



Предложи пострадавшему сплевывать кровь. (При попадании крови в желудок может развиваться рвота.)



Приложи холод к переносице (мокрый платок, снег, лед).



Если кровотечение из носа не остановилось в течение 15 минут - введи в носовые ходы свернутые в рулончик марлевые тампоны.

Если кровотечение в течение 15-20 минут не останавливается, направь пострадавшего в лечебное учреждение.

СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района».